



Tekuté antiseptikum na pokožku, rány a sliznice.

octenisept® 0,1 g / 100 g kožní sprej, roztok

Naše plus:

- Bezbolestný – nepálí a nedráždí
- Bezbarvý
- Dezinfikuje a čistí rány, ničí mikroby
- Stimuluje procesy hojení rány a napomáhá regeneraci pokožky
- Vhodný během těhotenství i kojení
- Vhodný pro novorozence, kojence, děti i dospělé
- Dle potřeby lze ohřát na teplotu těla

Oblast použití:

octenisept® 0,1 g / 100 g kožní sprej, roztok je určený:

- Pro opakovanou podpůrnou antiseptickou léčbu akutních i chronických ran, chirurgických ran, dekubitů a popálenin.
- Pro antiseptické ošetření sliznic a přilehlých oblastí kůže před diagnostickými a chirurgickými intervencemi v dutině ústní, anogenitálních a urogenitálních oblastech (katetrizace močového měchýře).

Návod na použití:

octenisept® 0,1 g / 100 g kožní sprej, roztok se nastříká na cílovou oblast tak, aby bylo zajištěno její úplné zvlhčení. Po aplikaci je třeba udržet dobu kontaktu alespoň 1 až 2 minuty, než jsou prováděny další zákroky. Nástup účinku octenisept® 0,1 g / 100 g kožní sprej, roztok je rychlý (1 min.) a dostatečná účinnost je zaručena po dobu 24 hod. od aplikace.

Použití	Expozice
Antiseptické ošetření urogenitálních a anogenitálních oblastí	1 min.
Antiseptické ošetření před katetrizací močového měchýře	1 min.
Rány	1 min.

Spektrum účinnosti:

Baktericidní (vč. MRSA, chlamydií a mykoplazmat), fungicidní na kvasinky a plísně, účinný na protozoa (Trichomonády), virucidní na HIV, HBV, HCV, Herpes simplex

Účinnost	Expozice
Baktericidní	30 s
Chlamydia trachomatis	30 s
MRSA	30 s
Neisseria gonorrhoeae	30 s
Pseudomonas aeruginosa	30 s
Gardnerella vaginalis	30 s
Candida albicans	2 min
Trichomonads spp.	1 min
Virucidní (HIV, HBV, HCV)	30 s

Zkrácená informace o léku

Složení: 0,1 g octenidinu dihydrochloridum, 2,0 g phenoxyethanolum v kožním spreji, roztoku. **Indikace:** Opakované krátkodobé antiseptické ošetření sliznice a přilehlých oblastí kůže před diagnostickými a chirurgickými zákroky v anogenitální oblasti vagíny, vulvy a glans penis, a také před katetrizací močového měchýře a pro opakované krátkodobé antiseptické ošetření ran. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Nesmí být aplikován přímo do očí, na ušní bubínek, při intraoperačním výplachu dutiny břišní a močového měchýře. **Balení:** 50 ml, 250 ml. **Dávkování a způsob podání:** Octenisept 0,1g/100g kožní sprej, roztok se nastříká na cílovou oblast tak, aby bylo zajištěno její úplné zvlhčení. Po aplikaci je třeba udržet dobu kontaktu alespoň 1 až 2 minuty, než jsou prováděny další zákroky. Dostatečná účinnost je zaručena pouze po dobu 2 hodin od aplikace přípravku Octenisept 0,1g / 100g kožní sprej, roztok. **Interakce:** Nepoužívejte současně s antiseptiky na bázi jodovaného povídku. **Nežádoucí účinky:** Celkové poruchy a reakce v místě aplikace. Vzácně: pálení, zarudnutí, svědění a pocit tepla v místě aplikace. Velmi vzácně: kontaktní alergická reakce. **Zvláštní upozornění:** Je třeba dbát na to, aby větší množství přípravku Octenisept 0,1g / 100g kožní sprej, roztok nebylo polknuto nebo aby se nedostalo do tělního oběhu např. jako důsledek náhodného vstříknutí. Aby se zabránilo poškození tkáně, přípravek nesmí být aplikován do tkáně pod tlakem. Z dutin v ranách musí být zajištěna drenáž (např. vhodným flexibilním drénem). Prozatím jsou zkušenosti pouze s používáním, které nepřesáhlo 14 dní, takže Octenisept má být používán pouze po omezenou dobu. Úplná informace – viz „Souhrn údajů o přípravku“. Přípravek je k dispozici v lékárnách na volný prodej a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Informace o ceně Vám podají zástupci společnosti Schülke CZ, s.r.o. **Výrobce / Držitel registračního rozhodnutí:** Schülke & Mayr GmbH, Robert-Koch-Str. 2, 22851 Norderstedt, Německo. **Registrační číslo:** 32/462/12-C. **Adresa v ČR:** Schülke CZ, s.r.o., Lidická 445, 735 81 Bohumín, tel.: +420 558 320 260, e-mail: schulkecz@schuelke.com. **Datum poslední revize textu:** 2.3.2016

octenisept® 0,1 g / 100 g kožní sprej, roztok

Složení:

100 g přípravku octenisept® 0,1 g / 100 g kožní sprej, roztok obsahuje následující látky:

- 0,1 g Octenidini dihydrochloride
- 2 g 2-Phenoxyethanol

Fyzikálně–chemické vlastnosti:

vzhled pH (koncentrát) hustota	bezbarvá kapalina cca. 6 / 20 °C cca 1,005 g/cm ³ / 20 °C
--------------------------------------	--

Logistické informace:

Název produktu	Balení	Ks v kartonu
octenisept® 0,1 g / 100 g kožní sprej, roztok	50 ml lahvička s rozstříkovačem 250 ml láhev s rozstříkovačem	10

Zvláštní upozornění:

Před použitím si důkladně přečtěte příbalovou informaci. Je třeba dbát na to, aby větší množství přípravku octenisept® 0,1 g / 100 g kožní sprej, roztok nebylo polknuto nebo aby se nedostalo do tělního oběhu např. jako důsledek náhodného vstříknutí. Aby se zabránilo poškození tkáně, přípravek nesmí být aplikován do tkáně pod tlakem. Z dutin v ranách musí být zajištěna drenáž (např. vhodným flexibilním drénem). Prozatím jsou zkušenosti pouze s používáním, které nepřesáhlo 14 dní, takže octenisept® 0,1 g / 100 g kožní sprej, roztok má být používán pouze po omezenou dobu. V těhotenství doporučeno použití přípravku po ukončení prvního trimestru. Pro kojící ženy je použití přípravku doporučeno na všechny oblasti těla mimo oblast prsu.

Doba expirace:

60 měsíců

Typ přípravku:

Léčivý přípravek

Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.



Schülke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu léčiv dle GMP certifikátu.



Součást skupiny Air Liquide.

Další informace:

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Výrobce:

Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 724 760 757
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schuelke.com

Distributor v ČR:

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: + 420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:

Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk